RIDOMIL® GOLD 2.5G

# ريدوميل جولد 2.5 ج

# التركيبة الذهبية



syngenta

RIDOMIL GOLD 2.5G

# ريدوميل جولد 2.5 ج

**ريدوميل جولد 2.5 ج** مبيد فطري جهازي ذو أثر متبق يستخدم للقضاء على فطريات التربة مثل أنواع Pythium و الPhytophthora و التي تسبب أمراض تعفن الجذور و موت البادرات و الساق على المحاصيل المختلفة كالتفاحيات، اللوزيات، الحمضيات، الخضراوات، و الفراولة.

## خصائص ريدوميل جولد 2.5 ج:

- تركيبة بطيئة الذوبان.
- جهازي.
- امتصاص سريع.
- يكافح أكثر من مرض.

## فوائد ريدوميل جولد 2.5 ج:

- فعالية طويلة الأمد.
- حماية كاملة للجذور و الساق.
- نتائج سريعة.
- مرونة في الاستخدام.

## طريقة عمل ريدوميل جولد 2.5 ج

- تدخل المادة الفعالة (فيفينوكسام م) جذور النباتات المعاملة بالمبيد.
- تنتقل بواسطة العصارة لتتوزع على جميع أجزاء النباتات كالجذور و الأغصان والنموات الحديثة.
- يزود هذا المبيد النباتات المعاملة به بقدرة داخلية تساعده على وقف نمو الفطريات المنبعثة من التربة و القضاء عليها.

## طريقة الاستعمال

- يتم تجهيز الأرض للزراعة بشكل اعتيادي بعد إزالة الأعشاب.
- ينثر ريدوميل على سطح التربة و يخلط جيداً مع التربة حتى عمق ١٠-١٥ سم.
- في حالة الزراعة على مساطب يوزع ريدوميل على المساطب فقط و يخلط مع التربة.
- **أشجار الفاكهة:** يضاف حول الساق بدائرة قطرها واحد متر، ينثر و يخلط مع التربة.
- يتم ري التربة بعد نثر المبيد.

## معدلات الاستخدام

| المحصول | المرض | معدل الاستخدام | فترة الانتظار قبل الجني | طريقة الاستخدام |
|---|---|---|---|---|
| التفاح | عفن الفيتوفثورا | ٢٠ غم للشجرة غير المثمرة<br>٤٠ غم للشجرة المثمرة الكبيرة | ٢١ يوم | -يضاف مرتين بالسنة حول الساق، الأولى بالربيع قبل الإزهار و الثانية بالخريف. |
| اللوزيات | عفن الفيتوفثورا<br>عفن بيثيوم | ١٠ غم/م٢ في المشتل<br>٢٠ غم/م٢ للغراس حتى عمر ٣ سنوات<br>٢٥-٥٠ غم/م٢ للأشجار أكبر من ٣ سنوات | لا يوجد فترة انتظار | -استخدام ريدوميل جولد ٢,٥ غم في التربة في أماكن توضع الجذور.<br>-كرر ذلك ٣ مرات في الشهر.<br>-يستخدم ريدوميل جولد ٢,٥ غم عند نقل الغراس من المشتل إلى الأرض الدائمة. |
| خضراوات | موت البادرات (بيثيوم، فيتوفثورا) | ٢ كغم/دونم | لا يوجد فترة انتظار | -ينثر و يقلب بالتربة بعمق ٥-١٠ سم. |
| الفراولة | عفن اللب الأحمر<br>عفن الريزومات | ١-٢ كغم/دونم<br>أو ١٠٠-٢٠٠غ/١٠٠م طولي بالسطر | ٢١ يوم | -ينثر على سطح التربة قبل الزراعة مباشرة بشكل شرائح عرضها ١٠ سم.<br>-يروى مباشرة. |
| حمضيات | عفن الجذور و التصمغ | ٤٠ غم/م٢ | ٢٨ يوم | -يضاف مرتين بالسنة حول الساق، الأولى بالربيع قبل الإزهار و الثانية بالخريف. |

الرجاء قراءة الملصق على العبوة بعناية لمعرفة إرشادات الاستعمال. ولمزيد من التفاصيل الرجاء الاتصال بالوكيل المعتمد.